MEDICA
laboratorium analiz medycznych

www.medica.radom.pl
tel./fax.:48 365 49 33
e-mail:medica@medica.radom.pl

Siedziba główna:
ul. Słowackiego 48/48a, Radom
Pn-Pt:6:30-18:00 Sob:6:30-13:00

Drugi punkt pobrań:
ul. Lubońskiego 2, Radom
Pn-Pt:7:00-9:00

Pieczęć zleceniodawcy	Kod zlecenia:	Data i godzina pobrania: .....
	Miejsce odbioru wyników:	Osoba pobierająca materiał: .....
		Rodzaj materiału: ☐ krew ☐ mocz ☐ kał ☐ wymaz

Dane pacjenta:
Imię i Nazwisko pacjenta:.....

PESEL: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Data urodzenia:**..... Płeć K/M

Adres zamieszkania: ..... **Tel.:** .....

SKIEROWANIE NA BADANIE LABORATORYJNE

ANALITYKA OGÓLNA

- ☐ MOCZ - BADANIE OGÓLNE + OSAD
- ☐ MOCZ - POSIEW + ANTYBIOGRAM
- ☐ BIAŁKO W PORCJI MOCZU
- ☐ GLUKOZA W PORCJI MOCZU
- ☐ KAŁ - BADANIE OGÓLNE
- ☐ KAŁ - KREW UTAJONA (FOB)
- ☐ KAŁ - PASOŻYTY
- ☐ WYMAZ NA OBECNOŚĆ OWSIKÓW
- ☐ KAŁ - Ag *HELICOBACTER PYROLI*
- ☐ KAŁ - Ag *GIARDIA LAMBLIA*
- ☐ KAŁ - Ag *ROTA-, ADENO-, I NOROWIRUS*
- ☐ KAŁ - TOKSYNA A/B *C.DIFFICILE* + GDH
- ☐ KAŁ - KALPROTEKTYNA (JAKOŚCIOWO)

HEMATOLOGIA

- ☐ MORFOLOGIA (CBC)
- ☐ MORFOLOGIA (CBC) + RET.
- ☐ MORFOLOGIA Z OBRAZEM 6DIFF
- ☐ MORFOLOGIA Z OBRAZEM 6DIFF+ RET.
- ☐ MIKROSKOPOWA OCENA ROZMAZU
- ☐ OB

DIAGNOSTYKA TARCZYCY I PRZYTARCZYC

- ☐ TSH ☐ FT3 ☐ FT4
- ☐ anty-TPO ☐ anty-TG ☐ TRAB
- ☐ TYREOGLOBULINA (TG) ☐ iPTH
- ☐ KALCYTONINA ☐ OSTEOKALCYNA

KOAGULOLOGIA

- ☐ **STAŁE ZLECENIE: PT + INR**

CZĘSTOTLIWOŚĆ: .....

TERMIN WAŻNOŚCI:.....

- ☐ PT + INR
- ☐ APTT
- ☐ CZAS TROMBINOWY (TT) ☐ BIAŁKO C
- ☐ FIBRYNOGEN ☐ BIAŁKO S
- ☐ D-DIMERY
- ☐ DRVVT (ANTYKOAGULANT TOCZNIA)

SEROLOGIA

- ☐ GRUPA KRWI
- ☐ p/ciała ANTYERYTROCYTARNE (PTA)

CHEMIA KLINICZNA

• GOSPODARKA WĘGLOWODANOWA

- ☐ GLUKOZA NA CZCZO
- ☐ GLUKOZA 60 min. 75G
- ☐ GLUKOZA 120 min. 75G
- ☐ INSULINA NA CZCZO
- ☐ INSULINA 60 min. 75G
- ☐ INSULINA 120 min. 75G
- ☐ C-PEPTYD NA CZCZO
- ☐ HbA1C met. HPLC
- ☐ HOMA-IR

• GOSPODARKA LIPIDOWA

- ☐ CHOLESTEROL CAŁKOWITY
- ☐ HDL
- ☐ LDL - met. WYLICZANA
- ☐ LDL - met. BEZPOŚREDNIA
- ☐ TRÓJGLICERYDY
- ☐ HOMOCYSTEINA
- ☐ LIPOPROTEINA (a)

• BIAŁKA STANU ZAPALNEGO

- ☐ CRP
- ☐ PROKALCYTONINA (PCT)

• PRÓBY NERKOWE

- ☐ MOCZNIK
- ☐ KREATYNINA + eGFR
- ☐ KWAS MOCZOWY

• PRÓBY WĄTROBOWE

- ☐ BILIRUBINA CAŁK.
- ☐ BILIRUBINA BEZP.
- ☐ AST
- ☐ ALT
- ☐ GGTP
- ☐ FOSFATAZA ZASADOWA (ALP)
- ☐ KW. ŻÓŁCIOWE (TBA)

• PRÓBY TRZUSTKOWE

- ☐ AMYLAZA (MOCZ)
- ☐ AMYLAZA (SUROWICA)
- ☐ LIPAZA

• INNE ENZYMY

- ☐ CPK
- ☐ LDH
- ☐ FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)

• ELEKTROLITY

- ☐ SÓD
- ☐ POTAS
- ☐ CHLORKI

• WITAMINY I MINERAŁY

- ☐ WAPŃ CAŁKOWITY
- ☐ WAPŃ ZJONIZOWANY
- ☐ FOSFOR
- ☐ MAGNEZ
- ☐ CYNK
- ☐ WITAMINA B12
- ☐ KWAS FOLIOWY (WITAMINA B9)
- ☐ WITAMINA D3 25(OH)

• OCENA GOSPODARKI ŻELAZEM

- ☐ ŻELAZO
- ☐ TIBC
- ☐ TRANSFERYNA
- ☐ FERRYTYNA

• INNE

- ☐ ASO ☐ RF ☐ anty-CCP
- ☐ IgA ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ BIAŁKO CAŁKOWITE ☐ ALBUMINY
- ☐ PROTEINOGRAM

MARKERY NOWOTWOROWE

- ☐ TEST ROMA ☐ PSA CAŁK. ☐ CEA
- ☐ CA 125 ☐ PSA WOLNE ☐ AFP
- ☐ HE4 ☐ CYFRA 21.1 ☐ CA 19.9
- ☐ SCC Ag ☐ NSE ☐ CA 72.4
- ☐ CA 15.3 ☐ TPS ☐ CA 50
- ☐ BTA (MOCZ) ☐ S-100

PIECZĘĆ I PODPIS LEKARZA:

VERTE →

REFUNDACJA NFZ W GABINECIE LEKARZA POZ

Liczba badań:

HORMONY PŁCIOWE

- ☐ AMH
- ☐ INHIBINA B
- ☐ B-HCG (ILOŚCIOWO)
- ☐ DHEA-SO4
- ☐ FSH
- ☐ DHEA
- ☐ LH
- ☐ SHBG
- ☐ ESTRADIOL
- ☐ PROGESTERON
- ☐ 17(OH)PROGESTERON
- ☐ ANDROSTENDION
- ☐ TESTOSTERON CAŁKOWITY
- ☐ TESTOSTERON WOLNY
- ☐ DHT (DIHYDROTESTOSTERON)
- ☐ PROLAKTYNA NA CZCZO
- ☐ PROLAKTYNA MAKRO (FRAKCJE)
- ☐ PROLAKTYNA PO MTC (0 i 60 min)

INNE HORMONY I METABOLITY

- ☐ GH
- ☐ IGF-1
- ☐ ACTH (7:00-9:00)
- ☐ ACTH (16:00)
- ☐ KORTYZOL (7:00-9:00)
- ☐ KORTYZOL (16:00)
- ☐ KORTYZOL W TEŚCIE HAMOWANIA
- ☐ ALDOSTERON
- ☐ RENINA

MARKERY KARDIOLOGICZNE

☐ CK-MB ☐ TROPONINA I ☐ NT pro-BNP

DIAGNOSTYKA CELIAKII

- anty-tTG (ImmunoCAP) ☐ IgA ☐ IgG
- p/ciała ENDOMYSIUM (EmA) ☐ IgA ☐ IgG
- p/ciała GLIADYNIE (DGP) ☐ IgA ☐ IgG

AUTOIMMUNOLOGIA

☐ ANA 1 ☐ ANA 2 ☐ ANA 3 ☐ ANA 4

DIAGNOSTYKA ALERGII

☐ IgE CAŁKOWITE ☐ TRYPTAZA ☐ DAO

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

- ☐ HBS Ag
- ☐ anty-HBS
- ☐ anty-HCV
- ☐ anty-HBC TOTAL
- ☐ HIV COMBO
- ☐ WR (VDRL)
- TOXO ☐ IgM ☐ IgG ☐ AWIDNOŚĆ
- CMV ☐ IgM ☐ IgG ☐ AWIDNOŚĆ
- RUBELLA ☐ IgM ☐ IgG ☐ AWIDNOŚĆ
- OSPA ☐ IgM ☐ IgG
- ODRA ☐ IgM ☐ IgG
- ŚWINKA ☐ IgM ☐ IgG
- EBV (MONONUKLEOZA) ☐ IgM ☐ IgG
- BORELIOZA (met. ELISA) ☐ IgM ☐ IgG
- BORELIOZA (met. W-BLOT) ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ HELICOBACTER PYLORI IgG

MIKROBIOLOGIA

- ☐ TEST Ag STREP A
- ☐ TEST Ag GRYPA A+B
- ☐ TEST Ag COVID-19
- ☐ TEST Ag RSV
- ☐ NUŻENIEC - RZĘSY
- ☐ OCENA STOPNIA CZYSTOŚCI POCHWY
- ☐ TEST Ag CHLAMYDIA TRACHOMATIS
- ☐ TEST Ag NEISSERIA GONORRHOEAE
- ☐ TRICHOMONAS VAGINALIS
- ☐ HPV DNA (met.PCR - JAKOŚCIOWO)

POSIEW BAKTERIOLOGICZNY

☐ KAŁ ☐ GARDŁO ☐ NOS
☐ POCHWA ☐ SZYJKA ☐ CEWKA

POSIEW MYKOLOGICZNY

☐ KAŁ ☐ GARDŁO ☐ NOS
☐ POCHWA ☐ SZYJKA ☐ CEWKA
☐ SKÓRA ☐ WŁOSY ☐ PAZNOKIE

INNE BADANIA

- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH - INSTRUKCJA DLA PACJENTA

BADANIA KRWI

- Zaleca się pobieranie krwi w godzinach rannych między 7 a 10.
- Pacjent powinien być co najmniej 10-12 godzin po spożyciu ostatniego posiłku, po wypoczynku nocnym.
- W dniu badania nie należy pić kawy, wody smakowej i soków oraz żuć gumy i palić papierosów.
- Zaleca się aby dzieci i osoby starsze na ok. 30 min. przed pobraniem krwi wypiły szklankę wody.
- Na 48 godzin przed badaniem należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, stresu, spożywania alkoholu oraz ziół, suplementów diety oraz preparatów witaminowych.
- Odstawienie leków należy skonsultować z lekarzem.

WYMAZ W KIERUNKU OWSIKÓW

- Owsiki są pasożytami składającymi jaja w nocy w fałdach skóry okolic odbytu, dlatego bardzo rzadko wykrywa się je podczas rutynowych badań kału. Do wykrywania jaj owsika opracowano metody, które polegają na wykonaniu wymazów okołoodbytniczych.
- Wymazy powinien być zrobiony wcześnie rano przed umyciem się i oddaniem kału przez pacjenta.
- Pobraną z laboratorium specjalną wymazówką należy wykonać wymaz okolic odbytu, sięgając delikatnie do końcowego jego odcinka.
- Następnie zamknąć wymazówkę w probówce i dostarczyć w ciągu 1-2 godzin do laboratorium.

BADANIE KAŁU

- Kał przeznaczony do pobrania materiału powinien zostać oddany na czysty papier toaletowy. Kału nie należy pobierać z muszli klozetowej - środki chemiczne uszkadzają jaja pasożytów).
- Porcję kału wielkości orzecha laskowego należy pobrać z różnych miejsc tej samej próbki kału za pomocą łopatki dołączonej do specjalnego jednorazowego opakowania.
- W wypadku badań bakteriologicznych i mykologicznych pojemnik musi być jałowy.
- Pobrany materiał należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Nie zamrażać.
- Kał w kierunku pasożytów należy pobrać 3-krotnie w odstępach 2-3 dniowych.

BADANIE MOCZU

- Powinna być to porcja moczu oddana po nocy, pobrana ze środkowego strumienia po zachowaniu higieny intymnej.
- Mocz należy oddać do jednorazowego naczynia. W przypadku badań mikrobiologicznych pojemnik musi być jałowy.
- W przypadku małych dzieci i niemowląt mocz zbiera się do specjalnego woreczka zakupionego w aptece. Woreczek nie powinien być przyklejony dłużej niż jedną godzinę.
- Pobrany mocz należy dostarczyć w ciągu 1 godz. do laboratorium.
- Kobiety powinny wykonać badanie min. 3 dni po menstruacji.
- Dzień przed planowanym badaniem zaleca się zachować wstrzemięźliwość płciową.
- W przypadkach nagłych mocz może być oddany o dowolnej porze dnia bez specjalnego przygotowania.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

- Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano, a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
- Pierwszą poranną porcję moczu należy w całości oddać do toalety, a każdą następną porcję moczu należy oddać w całości do pojemnika. Ostatnią porcją moczu jest pierwsza poranna próbka moczu dnia następnego.
- Zebraną dobową zbiórkę moczu należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie do laboratorium.
- Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu należy zachować ogólnie przyjęte zasady higieny, a pojemnik z moczem przechowywać w zacienionym i chłodnym miejscu.

POSIEWY BAKTERIOLOGICZNE I MYKOLOGICZNE

- Wszystkie materiały diagnostyczne do badań mikrobiologicznych należy pobierać we wczesnym okresie choroby, przed podaniem choremu antybiotyków lub 3-4 dni po ich odstawieniu.
- Pacjent, od którego pobierany będzie wymaz z okolic jamy ustnej powinien być na czczo. W dniu badania nie należy stosować płukanek do ust i innych środków o miejscowym działaniu bakteriobójczym.
- Pacjentki nie mogą być w trakcie miesiączki oraz nie powinny stosować środków odkażających i dopochwowych preparatów leczniczych.

☐ *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania oraz kasowania moich danych osobowych.*
☐ *Wyrażam zgodę na na wykorzystanie mojego materiału biologicznego do celów naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny.*

Radom, dnia: ..... *Podpis Pacjenta:* .....